

卵巣がん

No	電カル名	薬剤名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間 (週)	催吐リスク
398	CBDCA/PTX	パクリタキセル カルボプラチン	パクリタキセル カルボプラチン	175 5-6	mg/m ² AUC	3時間 1時間	day1 day1	点滴静注 点滴静注	3	中等度
400	CBDCA/DOC	ドセタキセル カルボプラチン	ドセタキセル水和物 カルボプラチン	75 5	mg/m ² AUC	1時間 1時間	day1 day1	点滴静注 点滴静注	3	中等度
415	L-ADR	ドキシル	ドキソルビシン塩酸塩 リポソーム注射剤	50	mg/m ²	1mg/min以上 (120分)	day1	点滴静注	4	軽度
417	GEM(4w)	ゲムシタビン	ゲムシタビン塩酸塩	1000	mg/m ²	30分	day1,8,15	点滴静注	4	軽度
468	DOC	ドセタキセル	ドセタキセル	70	mg/m ²	1時間	day1	点滴静注	3	軽度
609	ddTC	パクリタキセル カルボプラチン	パクリタキセル カルボプラチン	80 6	mg/m ² AUC	1時間 1時間	day1,8,15 day1	点滴静注 点滴静注	3	中等度
736	NGT	ハイカムチン	ノギテカン塩酸塩	1.5	mg/m ²	30分	day1-5	点滴静注	3	軽度
1016	BEVA/CBDCA/PTX(維持)	パクリタキセル カルボプラチン アバスチン	パクリタキセル カルボプラチン ベバシズマブ（遺伝子組換え）	175 6 15	mg/m ² AUC mg/kg	3時間 1時間 30-90分	day1 day1 day1	点滴静注 点滴静注 点滴静注	3	中等度
1025	BEVA/CBDCA/GEM	ゲムシタビン カルボプラチン アバスチン	ゲムシタビン塩酸塩 カルボプラチン ベバシズマブ（遺伝子組換え）	1000 4 15	mg/m ² AUC mg/kg	30分 1時間 30-90分	day1,8 day1 day1	点滴静注 点滴静注 点滴静注	3	中等度
1037	BEVA/NGT	ハイカムチン アバスチン	ノギテカン塩酸塩 ベバシズマブ（遺伝子組換え）	1.25 15	mg/m ² mg/kg	30分 30-90分	day1-5 day1	点滴静注 点滴静注	3	軽度
1476	ddCT/BEVA	パクリタキセル カルボプラチン アバスチン	パクリタキセル カルボプラチン ベバシズマブ（遺伝子組換え）	80 6 15	mg/m ² AUC mg/kg	1時間 1時間 30-90分	day1,8,15 day1 (1-6コースまで) day1 (1-6コースまで) day1	点滴静注 点滴静注 点滴静注	3	中等度