

大腸がん

No	レジメン名	薬剤名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間(週)	催吐リスク
379	CPT-11(B法)	イリノテカン	イリノテカン塩酸塩水和物	150	mg/m ²	90分	day1	点滴静注	2週間間隔で2~3 回投与し、少なく とも3週間休薬	中等度
388	mFOLFIRI	イリノテカン	イリノテカン塩酸塩水和物	150	mg/m ²	2時間	day1	点滴静注	2週間	中等度
		レボホリナート	レボホリナートカルシウム	200	mg/m ²	2時間	day1	点滴静注		
		5-F U	フルオロウラシル	400	mg/m ²	急速	day1	点滴静注		
		5-F U	フルオロウラシル	2400	mg/m ²	46時間 (5ml/hr)	day1-2	点滴静注		
389	mFOLFOX6	エルプラット	オキサリプラチン	85	mg/m ²	2時間	day1	点滴静注	2週間	中等度
		レボホリナート	レボホリナートカルシウム	200	mg/m ²	2時間	day1	点滴静注		
		5-F U	フルオロウラシル	400	mg/m ²	急速	day1	点滴静注		
		5-F U	フルオロウラシル	2400	mg/m ²	46時間 (5ml/hr)	day1-2	点滴静注		
496	BEVA/CAPE/I-OHP(Xelox)	アバスチン	ペバシズマブ	7.5	mg/kg	30-90分	day1	点滴静注	3週間	中等度
		エルプラット	オキサリプラチン	130	mg/m ²	2時間	day1	点滴静注		
		カペシタビン	カペシタビン	2000	mg/m ²		day1-14	経口		
616	BEVA/CAPE/CPT-11(XELIRI)	アバスチン	ペバシズマブ	7.5	mg/kg	30-90分	day1	点滴静注	3週間	中等度
		イリノテカン	イリノテカン塩酸塩水和物	200	mg/m ²	2時間	day1	点滴静注		
		カペシタビン	カペシタビン	1600	mg/m ²		day1-14	経口		
642	CET	アービタックス	セツキシマブ	250 (導入時day1のみ400mg/m ²)	mg/m ²	250 : 1時間 400 : 2時間	day1	点滴静注	1週間	最小度
657	PANI	ベクティビックス	パニツムマブ	6	mg/kg	1時間	day1	点滴静注	2週間	最小度
659	PANI/mFOLFIRI	ベクティビックス	パニツムマブ	6	mg/Kg	1時間	day1	点滴静注	2週間	中等度
		イリノテカン	イリノテカン塩酸塩水和物	150	mg/m ²	2時間	day1	点滴静注		
		レボホリナート	レボホリナートカルシウム	200	mg/m ²	2時間	day1	点滴静注		
		5-F U	フルオロウラシル	400	mg/m ²	急速	day1	点滴静注		
		5-F U	フルオロウラシル	2400	mg/m ²	46時間 (5ml/hr)	day1-2	点滴静注		
660	PANI/mFOLFOX	ベクティビックス	パニツムマブ	6	mg/kg	1時間	day1	点滴静注	2週間	中等度
		エルプラット	オキサリプラチン	85	mg/m ²	2時間	day1	点滴静注		
		レボホリナート	レボホリナートカルシウム	200	mg/m ²	2時間	day1	点滴静注		
		5-F U	フルオロウラシル	400	mg/m ²	急速	day1	点滴静注		
		5-F U	フルオロウラシル	2400	mg/m ²	46時間 (5ml/hr)	day1-2	点滴静注		

大腸がん

No	レジメン名	薬剤名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間(週)	催吐リスク
661	BEVA/CPT-11/S-1	エスワンタイホウ	S-1	80	mg/m ²		day1-14	経口	3週間	中等度
		イリノテカン	イリノテカン塩酸塩水和物	150	mg/m ²	90分-120分	day1	点滴静注		
		アバスチン	ペバシズマブ	7.5	mg/Kg	30-90分	day1	点滴静注		
662	BEVA/SOX	エスワンタイホウ	S-1	80	mg/m ²		day1-14	経口	3週間	中等度
		エルプラット	オキサリプラチン	130	mg/m ²	90分-120分	day1	点滴静注		
		アバスチン	ペバシズマブ	7.5	mg/kg	30-90分	day1	点滴静注		
663	BEVA(5)/mFOLFIRI	アバスチン	ペバシズマブ	5または10	mg/Kg	30-90分	day1	点滴静注	2週間	中等度
		イリノテカン	イリノテカン塩酸塩水和物	150	mg/m ²	2時間	day1	点滴静注		
		レボホリナート	レボホリナートカルシウム	200	mg/m ²	2時間	day1	点滴静注		
		5-F U	フルオロウラシル	400	mg/m ²	急速	day1	点滴静注		
		5-F U	フルオロウラシル	2400	mg/m ²	46時間 (5ml/hr)	day1-2	点滴静注		
677	CET/CPT-11(bi-weekly)	アービタックス	セツキシマブ	1コース目day1: 400 1コース目day8: 250 2コース目以降: 500	mg/m ²	250: 1時間 400: 2時間 500: 2時間	1コース目: day1,8 2コース目以降: day1	点滴静注	2週間	中等度
		イリノテカン	イリノテカン塩酸塩水和物	150	mg/m ²	90分	day1	点滴静注		
719	BEVA/CAPE	アバスチン	ペバシズマブ	7.5	mg/kg	30-90分	day1	点滴静注	3週間	軽度
		カペシタビン	カペシタビン	2500	mg/m ²		day1-14	経口		
743	CAPE/I-OHP(Xelox)	エルプラット	オキサリプラチン	130	mg/m ²	2時間	day1	点滴静注	3週間	中等度
		カペシタビン	カペシタビン	2000	mg/m ²		day1-14	経口		
797	CET/mFOLFOX6	アービタックス	セツキシマブ	250 (導入時day1のみ400mg/m ²)	mg/m ²	250: 1時間 400: 2時間	day1,8	点滴静注	2週間	中等度
		エルプラット	オキサリプラチン	85	mg/m ²	2時間	day1	点滴静注		
		レボホリナート	レボホリナートカルシウム	200	mg/m ²	2時間	day1	点滴静注		
		5-F U	フルオロウラシル	400	mg/m ²	急速	day1	点滴静注		
		5-F U	フルオロウラシル	2400	mg/m ²	46時間 (5ml/hr)	day1-2	点滴静注		
802	BEVA/mFOLFOX6	アバスチン	ペバシズマブ	5または10	mg/kg	30-90分	day1	点滴静注	2週間	中等度
		エルプラット	オキサリプラチン	85	mg/m ²	2時間	day1	点滴静注		
		レボホリナート	レボホリナートカルシウム	200	mg/m ²	2時間	day1	点滴静注		
		5-F U	フルオロウラシル	400	mg/m ²	急速	day1	点滴静注		
		5-F U	フルオロウラシル	2400	mg/m ²	46時間 (5ml/hr)	day1-2	点滴静注		

大腸がん

No	レジメン名	薬剤名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間(週)	催吐リスク
970	FOLFOXIRI	イリノテカン	イリノテカン塩酸塩水和物	165	mg/m ²	1時間	day1	点滴静注	2週間	高度
		エルプラット	オキサリプラチン	85	mg/m ²	2時間	day1	点滴静注		
		レボホリナート	レボホリナートカルシウム	200	mg/m ²	2時間	day1	点滴静注		
		5-F U	フルオロウラシル	3200	mg/m ²	48時間 (5ml/hr)	day1-2	点滴静注		
971	BEVA/FOLFOXIRI	アバスタチン	ベバシズマブ	5	mg/kg	30-90分	day1	点滴静注	2週間	高度
		イリノテカン	イリノテカン塩酸塩水和物	165	mg/m ²	1時間	day1	点滴静注		
		エルプラット	オキサリプラチン	85	mg/m ²	2時間	day1	点滴静注		
		レボホリナート	レボホリナートカルシウム	200	mg/m ²	2時間	day1	点滴静注		
5-F U	フルオロウラシル	3200	mg/m ²	48時間 (5ml/hr)	day1-2	点滴静注				
984	PANI/CPT-11	イリノテカン	イリノテカン塩酸塩水和物	150	mg/m ²	90分	day1	点滴静注	2週間	中等度
		ベクティビックス	パニツムマブ	6	mg/Kg	1時間	day1	点滴静注		
1106	CET/CPT-11	アービタックス	セツキシマブ	250 (導入時day1のみ400mg/m ²)	mg/m ²	250 : 1時間 400 : 2時間	day1,8	点滴静注	2週間	中等度
		イリノテカン	イリノテカン塩酸塩水和物	150	mg/m ²	90分	day1	点滴静注		
1141	CPT-11/S-1(IRIS)(q4w)	エスワンタイホウ	S-1	80	mg/m ²		day1-14	経口	4週間	中等度
		イリノテカン	イリノテカン塩酸塩水和物	125	mg/m ²	90分	day1,15	点滴静注		
1146	RAM+mFOLFIRI	サイラムザ	ラムシルマブ	8	mg/Kg	30-60分	day1	点滴静注	2週間	中等度
		イリノテカン	イリノテカン塩酸塩水和物	150	mg/m ²	2時間	day1	点滴静注		
		レボホリナート	レボホリナートカルシウム	200	mg/m ²	2時間	day1	点滴静注		
		5-F U	フルオロウラシル	400	mg/m ²	急速	day1	点滴静注		
5-F U	フルオロウラシル	2400	mg/m ²	46時間 (5ml/hr)	day1-2	点滴静注				
1192	BEVA/TAS-102	アバスタチン	ベバシズマブ	5	mg/kg	30-90分	day1,15	点滴静注	4週間	中等度
		ロンサーフ	トリフルリジン・チピラシル	70	mg/m ²		day1-5,8-12	経口		
1217	CET/mFOLFIRI	アービタックス	セツキシマブ	250 (導入時day1のみ400mg/m ²)	mg/m ²	250 : 1時間 400 : 2時間	day1,8	点滴静注	2週間	中等度
		イリノテカン	イリノテカン塩酸塩水和物	150	mg/m ²	2時間	day1	点滴静注		
		レボホリナート	レボホリナートカルシウム	200	mg/m ²	2時間	day1	点滴静注		
		5-F U	フルオロウラシル	400	mg/m ²	急速	day1	点滴静注		
5-F U	フルオロウラシル	2400	mg/m ²	46時間 (5ml/hr)	day1-2	点滴静注				

大腸がん

No	レジメン名	薬剤名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間(週)	催吐リスク
1240	AFL/mFOLFIRI	ザルトラップ	アフリベルセプト ベータ	4	mg/Kg	1時間	day1	点滴静注	2週間	中等度
		イリノテカン	イリノテカン塩酸塩水和物	150	mg/m ²	2時間	day1	点滴静注		
		レボホリナート	レボホリナートカルシウム	200	mg/m ²	2時間	day1	点滴静注		
		5-FU	フルオロウラシル	400	mg/m ²	急速	day1	点滴静注		
		5-FU	フルオロウラシル	2400	mg/m ²	46時間 (5ml/hr)	day1-2	点滴静注		
1392	BEVA/CPT-11/S-1(q4w)	エスワンタイホウ	S-1	80	mg/m ²		day1-14	経口	4週間	中等度
		イリノテカン	イリノテカン塩酸塩水和物	100	mg/m ²	90分	day1,15	点滴静注		
		アバスチン	ベバシズマブ	5	mg/Kg	30-90分	day1,15	点滴静注		
1546	CET/Enco(BEACON)	アービタックス	セツキシマブ	250 (導入時day1のみ400mg/m ²)	mg/m ²	250 : 1時間 400 : 2時間	day1	点滴静注	1週間	中等度
		ビラフトビ	エンコラフェニブ	300	mg/body		day1-7	経口		
1547	CET/Bini/Enco(BEACON)	アービタックス	セツキシマブ	250 (導入時day1のみ400mg/m ²)	mg/m ²	250 : 1時間 400 : 2時間	day1	点滴静注	1週間	中等度
		ビラフトビ	エンコラフェニブ	300	mg/body		day1-7	経口		
		メクトビ	ビニメチニブ	90	mg/body		day1-7	経口		