25. 広域抗菌薬使用時の血液培養2セット実施率 (%)

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 令和2年度 | 82.60 | 76.50 | 73.00 | 84.10 | 88.40 | 75.90 | 86.00 | 88.20 | 79.90 | 81.80 | 87.20 | 85.90 | 82.46 |
| 令和3年度 | 76.40 | 80.50 | 78.50 | 86.00 | 82.40 | 77.20 | 81.00 | 83.10 | 89.10 | 82.10 | 81.80 | 83.70 | 81.82 |
| 令和4年度 | 87.50 | 86.60 | 84.90 | 85.60 | 84.60 | 87.90 | 88.80 | 88.90 | 90.50 | 88.80 | 90.10 | 84.60 | 87.40 |
| 令和5年度 | 91.30 | 94.00 | 89.50 | 92.40 | 91.40 | 90.40 | 93.80 | 90.20 | 91.80 | 90.20 | 92.30 | 90.20 | 91.46 |

医療の質改善へ繋がった具体的な活動等

高い遵守率を維持できている抗菌薬適正使用に繋がっている。