

膵臓がん

No	レジメン名	薬剤名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間 (週)	催吐リスク
6	GEM	ゲムシタビン	ゲムシタビン塩酸塩	1000	mg/m ²	30分	day1,8,15	点滴静注	4	軽度
665	GEM/S-1	ゲムシタビン エスワンタイホウ	ゲムシタビン塩酸塩 S-1	1000 80	mg/m ² mg/m ²	30分	day1,8 14日間連日	点滴静注 経口	3	中等度
788	GEM/erlotinib	ゲムシタビン タルセバ	ゲムシタビン塩酸塩 エルロチニブ塩酸塩	1000 100	mg/m ² mg/body	30分	day1,8,15 day1-28	点滴静注 経口	4	軽度
960	FOLFIRINOX	エルプラット イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	オキサリプラチン イリノテカン塩酸塩水和物 レボホリナートカルシウム フルオロウラシル フルオロウラシル	85 180 200 400 2400	mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ²	2時間 90分 2時間 急速静注 46時間	day1 day1 day1 day1 day1-2	点滴静注 点滴静注 点滴静注 静注 点滴静注	2	高度
1039	GEM/nab-PTX	ゲムシタビン アブラキサシ	ゲムシタビン塩酸塩 パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	1000 125	mg/m ² mg/m ²	30分 30分	day1,8,15 day1,8,15	点滴静注 点滴静注	4	中等度
1058	STZ	ザノサー	ストレプトゾシン	500	mg/m ²	30分	day1-5	点滴静注	6	高度
1161	5-FU/STZ	ザノサー フルオロウラシル	ストレプトゾシン フルオロウラシル	500 400	mg/m ² mg/m ²	30-120分 30分	day1-5 day1-5	点滴静注 点滴静注	6	高度
1331	mFOLFIRINOX	エルプラット イリノテカン レボホリナート 5-FU	オキサリプラチン イリノテカン塩酸塩水和物 レボホリナートカルシウム フルオロウラシル	85 150 200 2400	mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ²	2時間 90分 2時間 46時間 (5ml/hr)	day1 day1 day1 day1-2	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	2	高度
1393	GEM/S1 (NAC)	ゲムシタビン エスワンタイホウ	ゲムシタビン塩酸塩 S-1	1000 80-120	mg/m ² mg/body	30分	day1,8 14日間連日	点滴静注 経口	3	中等度
1403	nal-IRI/5FU/l-LV	オニバイド レボホリナート フルオロウラシル	イリノテカン塩酸塩水和物 レボホリナートカルシウム フルオロウラシル	70 200 2400	mg/m ² mg/m ² mg/m ²	90分 2時間 46時間	day1 day1 day1-2	点滴静注 点滴静注 点滴静注	2	中等度