

## 胆道がん

No	レジメン名	薬剤名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間 (週)	催吐リスク
5	GEM	ゲムシタビン	ゲムシタビン塩酸塩	1000	mg/m <sup>2</sup>	30分	day1,8,15	点滴静注	4	軽度
161	GEM/S-1	ゲムシタビン エスワнтаイホウ	ゲムシタビン塩酸塩 S-1	1000 60-80	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	30分	day1,8 14日間連日	点滴静注 経口	3	軽度
675	CDDP/GEM	シスプラチン ゲムシタビン	シスプラチン ゲムシタビン塩酸塩	25 1000	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	2時間 30分	day1,8 day1,8	点滴静注 点滴静注	3	高度
1555	CCDP/GEM/S-1(GCS)	ゲムシタビン シスプラチン エスワнтаイホウ	ゲムシタビン塩酸塩 シスプラチン S-1	1000 25 80	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	30分 1時間	day1 day1 day1-7	点滴静注 点滴静注 経口	2	高度