

# 頭頸部がん

No	レジメン名	薬剤名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間(週)	催吐リスク
627	5-FU/CDDP(FP)	シスプラチン	シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	点滴静注	3~5	高度
		5-F U	フルオロウラシル	800	mg/m <sup>2</sup>	24時間	day1-5	点滴静注		
632	5-FU/CDDP/DOC(TPF)	ドセタキセル	ドセタキセル水和物	70	mg/m <sup>2</sup>	1時間	day1	点滴静注	3	高度
		シスプラチン	シスプラチン	70	mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	点滴静注		
		5-F U	フルオロウラシル	750	mg/m <sup>2</sup>	24時間	day1-5	点滴静注		
633	CDDP/RT	シスプラチン	シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	点滴静注	3	高度
635	CBDCA (AUC1.5) /RT	カルボプラチン	カルボプラチン	1.5	AUC	1時間	day1	点滴静注	1	中等度
637	DOC	ドセタキセル	ドセタキセル	60	mg/m <sup>2</sup>	1時間	day1	点滴静注	3~4	軽度
688	5-FU/CBDCA/RT	カルボプラチン	カルボプラチン	5	AUC	1時間	day1	点滴静注	4~5	中等度
		5-F U	フルオロウラシル	400	mg/m <sup>2</sup>	24時間	day1-5	点滴静注		
689	5-FU/CDDP/RT(FP+RT)	シスプラチン	シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	点滴静注	4	高度
		5-F U	フルオロウラシル	400	mg/m <sup>2</sup>	24時間	day1-5	点滴静注		
812	5-FU/CDDP(FP分割)	シスプラチン	シスプラチン	20	mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1-4	点滴静注	4~5	高度
		5-F U	フルオロウラシル	800	mg/m <sup>2</sup>	24時間	day1-5	点滴静注		
813	PTX	パクリタキセル	パクリタキセル	100	mg/m <sup>2</sup>	1時間	day1,8,15 ,22,29,36	点滴静注	8	軽度
869	CDDP(40)(weekly)/RT	シスプラチン	シスプラチン	40	mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	点滴静注	7	高度
870	CET	アービタックス	セツキシマブ (遺伝子組換え)	250 (導入時の day1のみ400)	mg/m <sup>2</sup>	250 : 1時間 400 : 2時間	day1	点滴静注	1	最小度
871	CET/5-FU/CDDP	シスプラチン	シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	点滴静注	3~5	高度
		5-F U	フルオロウラシル	1000	mg/m <sup>2</sup>	24時間	day1-4	点滴静注		
		アービタックス	セツキシマブ (遺伝子組換え)	250 (導入時の day1のみ400)	mg/m <sup>2</sup>	250 : 1時間 400 : 2時間	day1,8,15 ,(22,29)	点滴静注		

# 頭頸部がん

No	レジメン名	薬剤名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間(週)	催吐リスク
872	CET/5-FU/CBDCA	カルボプラチン 5-FU アービタックス	カルボプラチン フルオロウラシル セツキシマブ（遺伝子組換え）	5 1000 250 (導入時の day1のみ400)	AUC mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	2時間 24時間 250：1時間 400：2時間	day1 day1-4 day1,8,15 ,(22,29)	点滴静注 点滴静注 点滴静注	3～5	中等度
1057	CBDCA (AUC5) /RT	カルボプラチン	カルボプラチン	5	AUC	2時間	day1	点滴静注	3	中等度
1103	CET (導入)	パクリタキセル アービタックス	パクリタキセル セツキシマブ（遺伝子組換え）	80 400	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	1時間 2時間	day1 day1	点滴静注 点滴静注	1	軽度
1104	CET (維持)	パクリタキセル アービタックス	パクリタキセル セツキシマブ（遺伝子組換え）	80 250	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	1時間 1時間	day1 day1	点滴静注 点滴静注	1	軽度
1122	CDDP(RADPLAT)	シスプラチン	シスプラチン	100	mg/m <sup>2</sup>	10分	day1	動注	3	高度
1265	NIVO(240)	オプジーボ	ニボルマブ（遺伝子組換え）	240	mg/body	30分	day1	点滴静注	2	最小度
1300	CET/CBDCA/PTX	カルボプラチン パクリタキセル アービタックス	カルボプラチン パクリタキセル セツキシマブ（遺伝子組換え）	2.5 100 250 (導入時の day1のみ400)	AUC mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	1時間 1時間 250：1時間 400：2時間	day1,8 day1,8 day1,8,15	点滴静注 点滴静注 点滴静注	3	中等度
1338	CET/CBDCA/PTX (IC-PCE/weekly) (初回)	カルボプラチン パクリタキセル アービタックス	カルボプラチン パクリタキセル セツキシマブ（遺伝子組換え）	1.5 80 400	AUC mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	1時間 1時間 2時間	day1 day1 day1	点滴静注 点滴静注 点滴静注	1	中等度
1339	CET/CBDCA/PTX (IC-PCE/weekly) (2回目以降)	カルボプラチン パクリタキセル アービタックス	カルボプラチン パクリタキセル セツキシマブ（遺伝子組換え）	1.5 80 250	AUC mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	1時間 1時間 1時間	day1 day1 day1	点滴静注 点滴静注 点滴静注	1	中等度
1358	CET (500/maintenance/q2w)	アービタックス	セツキシマブ（遺伝子組換え）	500	mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	点滴静注	2	最小度

## 頭頸部がん

No	レジメン名	薬剤名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間(週)	催吐リスク
1372	Pembrolizumab	キイトルーダ	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)	200	mg/body	30分	day1	点滴静注	3	最小度
1373	Pembrolizumab/5-FU/CDDP	シスプラチン	シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	点滴静注	3	高度
		5-FU	フルオロウラシル	1000	mg/m <sup>2</sup>	24時間	day1-4	点滴静注		
		キイトルーダ	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)	200	mg/body	30分	day1	点滴静注		
1374	Pembrolizumab/5-FU/CBDCA	カルボプラチン	カルボプラチン	5	AUC	2時間	day1	点滴静注	3	中等度
		5-FU	フルオロウラシル	1000	mg/m <sup>2</sup>	24時間	day1-4	点滴静注		
		キイトルーダ	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)	200	mg/body	30分	day1	点滴静注		
1420	NIVO(480/q4w)	オプジーボ	ニボルマブ(遺伝子組換え)	480	mg/body	30分	day1	点滴静注	4	最小度
1435	Pembrolizumab(q6w)	キイトルーダ	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)	400	mg/body	30分	day1	点滴静注	6	最小度