

No	電カル名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間 (日)	催吐リスク	がんの種類
5	GEM	ゲムシタピン	1000	mg/m <sup>2</sup>	30分	day1,8,15	点滴		28 軽度	胆道がん
6	GEM	ゲムシタピン	1000	mg/m <sup>2</sup>	30分	day1,8,15	点滴		28 軽度	膵がん
665	GEM/S-1	ゲムシタピン S-1	1000 80	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	30分 分2(朝・夕食後)	day1,8 day1-14	点滴 経口		21 中等度	膵がん
675	CDDP/GEM	シスプラチン ゲムシタピン	25 1000	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	1時間 30分	day1,8 day1,8	点滴 点滴		21 高度	胆道がん
788	GEM/erlotinib	ゲムシタピン エルロチニブ	1000 100	mg/m <sup>2</sup> mg/body	30分 分1(空腹時)	day1,8,15 連日	点滴 経口		28 軽度	膵がん
960	FOLFIRINOX	オキサリプラチン イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	85 180 200 400 2400	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	2時間 90分 2時間 急速静注 46時間	day1 day1 day1 day1 day1-2	点滴 点滴 点滴 静注 点滴		14 高度	膵がん
1039	GEM/nab-PTX	ゲムシタピン パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	1000 125	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	30分 30分	day1,8,15 day1,8,15	点滴 点滴		28 中等度	膵がん
1058	STZ	ストレプトゾシン	500	mg/m <sup>2</sup>	30分	day1-5	点滴		42 高度	膵がん
1161	5-FU/STZ	ストレプトゾシン フルオロウラシル	500 400	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	30-120分 30分	day1-5 day1-5	点滴 点滴		42 高度	膵がん
1294	Pembrolizumab	ペムブロリズマブ	200	mg/body	30分	day1	点滴		21 最小度	MSI-High固形がん
1329	RAM	ラムシルマブ	8	mg/kg	60分 (2回目以降30分可)	day1	点滴		14 最小度	肝臓がん
1393	GEM/S1 (NAC)	ゲムシタピン S-1	1000 120	mg/m <sup>2</sup> mg/body	30分 分2(朝・夕食後)	day1,8 day1-14	点滴 経口		21 中等度	膵がん
1403	nal-IRI/5FU/I-LV	イリノテカン塩酸塩水和物 レボホリナート フルオロウラシル	70 200 2400	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	90分 2時間 46時間	day1 day1 day1-2	点滴 点滴 点滴		14 中等度	膵がん
1428	Atezolizumab/BEVA	アテゾリズマブ ベバシズマブ	1200 15	mg/body mg/kg	60分 (2回目以降30分可) 90→60→30分可	day1 day1	点滴 点滴		21 軽度	肝臓がん
1434	Pembrolizumab (q6w)	ペムブロリズマブ	400	mg/body	30分	day1	点滴		42 最小度	MSI-High固形がん
1607	GEM/RT	ゲムシタピン	1000	mg/m <sup>2</sup>	30分	day1,8,15	点滴		28 軽度	膵臓がん
1608	なし (内服のみ)	S-1	80	mg/m <sup>2</sup>	分2(朝・夕食後)	day1-21,22-35	経口		52 軽度	膵臓がん
1644	Durvalumab/CDDP/GEM	ゲムシタピン シスプラチン デュルバルマブ デュルバルマブ	1000 25 1500 20	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/body mg/kg	30分 1時間 1時間 1時間	day1,8 day1,8 day1 day1	点滴 点滴 点滴 点滴	9コース目以降Durvalumabのみ 4週間毎でPDまで継続	高度	胆道がん
1691	CDDP/VP-16(PE)	シスプラチン エトポシド	80 100	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	1-2時間 1-2時間	day1 day1-3	点滴 点滴		21 高度	神経内分泌がん
1744	Pembrolizumab/CDDP/GEM	ゲムシタピン シスプラチン ペムブロリズマブ	1000 25 200	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/body	30分 1時間 30分	day1,8 day1,8 day1	点滴 点滴 点滴		21 高度	胆道がん

No	電カル名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間 (日)	催吐リスク	がんの種類
1849	Ipilimumab/NIVO	イピリムマブ	3	mg/kg	30分	day1	点滴		21 最小度	肝臓がん
		ニボルマブ	80	mg/body	30分	day1	点滴			
		ニボルマブ	240	mg/body	30分	day1	点滴			
		ニボルマブ	480	mg/body	30分	day1	点滴			