

No	電カル名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間 (日)	催吐リスク	がんの種類
298	BLM	ブレオマイシン	60	mg/body	-	day1	胸腔内	なし		乳がん
1062	RAM	ラムシルマブ	8	mg/kg	60分(2回目以降30分可)	day1	点滴	14	最小度	胃がん
1063	RAM/PTX	ラムシルマブ パクリタキセル	8 80	mg/kg mg/m ²	60分(2回目以降30分可) 1時間	day1,15 day1,8,15	点滴 点滴	28	軽度	胃がん
1097	HP/ERI	ベルツズマブ ベルツズマブ トラスツズマブ トラスツズマブ エリブリン	840 420 8 6 1.4	mg/body mg/body mg/kg mg/kg mg/m ²	1時間(2回目以降30分可) 1時間(2回目以降30分可) 90分(2回目以降30分可) 90分(2回目以降30分可) 5分	day1(初回または3週以上遅延時) day1(2回目以降) day1(初回または1週超え遅延時) day1(2回目以降) day1,8	点滴 点滴 点滴 点滴 点滴	21	軽度	乳がん
1165	ADR/CPA(ddAC)	ドキソルピシン シクロホスファミド	60 600	mg/m ² mg/m ²	20-30分 15-20分	day1 day1	点滴 点滴	14	高度	乳がん
1714	PHESGO/DOC	フェスゴ フェスゴ ドセタキセル	15 10 75	mL/body mL/body mg/m ²	8分 5分 1時間	day1(初回または6週以上遅延時) day1(2回目以降) day1	皮下注 皮下注 点滴	21	軽度	乳がん
1715	PHESGO	フェスゴ フェスゴ	15 10	mL/body mL/body	8分 5分	day1(初回または6週以上遅延時) day1(2回目以降)	皮下注 皮下注	21	最小度	乳がん
1793	Sacituzumab Govitecan	サシツズマブ ゴビテカン	10	mg/kg	3時間(2回目以降1-2時間)	day1,8	点滴	21	中等度	乳がん
1817	Dato-DXd	ダトポタマブ デルクステカン	6	mg/kg	90分(2回目以降30分可)	day1	点滴	21	中等度	乳がん