

No	電カル名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間 (日)	催吐リスク	がんの種類
394	ADR/CDDP (AP)	ドキソルビシン シスプラチン	60 50	mg/ml mg/ml	10分 2時間	day1 day1	点滴 点滴		21 高度	子宮体がん
396	CDDP/RT(CCRT)	シスプラチン	40	mg/ml	2時間	day1	点滴		7 高度	子宮頸がん
398	CBDCA/PTX	パクリタキセル カルボプラチン	175 6	mg/ml AUC	3時間 1時間	day1 day1	点滴 点滴		21 中等度	卵巣がん/子宮体がん/子宮頸がん
399	CPT-11	イリノテカン	150	mg/ml	90分	day1	点滴	2週間隔で2-3回投与後 21日間休薬	中等度	卵巣がん/子宮頸がん
400	CBDCA/DOC	ドセタキセル カルボプラチン	75 5	mg/ml AUC	1時間 1時間	day1 day1	点滴 点滴		21 中等度	卵巣がん
403	BLM/CDDP/VP-16(BEP)	ブレオマイシン エトポシド シスプラチン	20 100 20	mg/ml mg/ml mg/kg	1時間 2時間 2時間	day2,9,16 day1,2,3,4,5 day1,2,3,4,5	点滴 点滴 点滴		21 高度	卵巣胚細胞腫瘍
415	L-ADR	ドキソルビシン塩酸塩 リボソーム注射剤	50	mg/ml	1mg/min以上 (120分)	day1	点滴		28 軽度	卵巣がん
417	GEM(4w)	ゲムシタピン	1000	mg/ml	30分	day1,8,15	点滴		28 軽度	卵巣がん
468	DOC	ドセタキセル	70	mg/ml	1時間	day1	点滴		21 軽度	卵巣がん/子宮体がん
609	ddTC	パクリタキセル カルボプラチン	80 6	mg/ml AUC	1時間 1時間	day1,8,15 day1	点滴 点滴		21 中等度	卵巣がん
650	DOC/GEM	ドセタキセル ゲムシタピン	75 900	mg/ml mg/ml	1時間 90分	day8 day1,8	点滴 点滴		21 軽度	肉腫
698	CBDCA/GEM	ゲムシタピン カルボプラチン	1000 4	mg/ml AUC	30分 60-120分	day1,8 day1	点滴 点滴		21 中等度	卵巣がん
699	CBDCA/L-ADR	ドキソルビシン塩酸塩 リボソーム注射剤 カルボプラチン	30 5	mg/ml AUC	60分 1時間	day1 day1	点滴 点滴		28 中等度	卵巣がん
703	GEM(3w)	ゲムシタピン	1000	mg/ml	30分	day1,8	点滴		21 軽度	卵巣がん
724	MTX (i.m.) MTX (i.v.)	メトトレキサート	50	mg/ml	30分	day1	点滴/筋注		7 中等度	子宮外妊娠(掲載外)
736	NGT	ノギテカン	1.5	mg/ml	30分	day1-5	点滴		21 軽度	卵巣がん
1015	BEVA/PTX(weekly)	パクリタキセル ベバシズマブ	80 15	mg/ml mg/kg	1時間 90→60→30分可	day1,8,15 day1	点滴 点滴		21 軽度	卵巣がん
1016	BEVA/CBDCA/PTX(維持)	パクリタキセル カルボプラチン ベバシズマブ	175 6 15	mg/ml AUC mg/kg	3時間 1時間 90→60→30分可	day1 day1 day1	点滴 点滴 点滴		21 中等度	卵巣がん
1025	BEVA/CBDCA/GEM	ゲムシタピン カルボプラチン ベバシズマブ	1000 4 15	mg/ml AUC mg/kg	30分 1時間 90→60→30分可	day1,8 day1 day1	点滴 点滴 点滴		21 中等度	卵巣がん
1036	BEVA(q2w)/L-ADR(q4w)	ドキソルビシン塩酸塩 リボソーム注射剤 ベバシズマブ	40 10	mg/ml mg/kg	90または120分 90→60→30分可	day1 day1,15	点滴 点滴		28 軽度	卵巣がん
1037	BEVA/NGT	ノギテカン ベバシズマブ	1.25 15	mg/ml mg/kg	30分 90→60→30分可	day1-5 day1	点滴 点滴		21 軽度	卵巣がん
1100	CDDP/NGT	ノギテカン シスプラチン	0.75 50	mg/ml mg/ml	30分 1-2時間	day1-3 day1	点滴 点滴		21 高度	子宮頸がん
1114	BEVA/CDDP/PTX	パクリタキセル シスプラチン ベバシズマブ	175 50 15	mg/ml mg/ml mg/kg	3時間 2時間 90→60→30分可	day1 day1 day1	点滴 点滴 点滴		21 高度	子宮頸がん
1137	BEVA(q3w)/L-ADR(q4w)	ドキソルビシン塩酸塩 リボソーム注射剤 ベバシズマブ	50 15	mg/ml mg/kg	90または120分 90→60→30分可	day1 day1	点滴 点滴		28 軽度	卵巣がん
1177	ERB	エリブリン	1.4	mg/ml	2-5分	day1,8	点滴		21 軽度	肉腫
1294	Pembrolizumab	ペムブロリズマブ	200	mg/body	30分	day1	点滴		21 最小度	MSI-High固形がん
1397	ADR	ドキソルビシン	75	mg/ml	10→30分	day1	点滴		21-28 中等度	肉腫
1407	IFM/PTX	パクリタキセル イホスファミド	135 1.6	mg/ml g/ml	3時間 2時間	day1 day1-3	点滴 点滴		21 中等度	肉腫

No	電カル名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間 (日)	催吐リスク	がんの種類
1409	BEVA/CBDCA/PTX	パクリタキセル カルボプラチン ペバシズマブ	175 5 15	mg/ml AUC mg/kg	3時間 1時間 90→60→30分可	day1 day1 day1	点滴 点滴 点滴	21	中等度	子宮頸がん
1434	Pembrolizumab (q6w)	ペムブロリズマブ	400	mg/body	30分	day1	点滴	42	最小度	MSI-High固形がん
1476	ddCT/BEVA	パクリタキセル カルボプラチン ペバシズマブ	80 6 15	mg/ml AUC mg/kg	1時間 1時間 90→60→30分可	day1,8,15(1-6コースまで) day1(1-6コースまで) day1	点滴 点滴 点滴	21	中等度	卵巣がん
1477	BEVA/CBDCA/L-ADR	ドキシソルピシン塩酸塩 リポソーム注射剤 カルボプラチン ペバシズマブ ペバシズマブ	30 5 10 15	mg/ml AUC mg/kg mg/kg	1時間 1時間 90→60→30分可 90→60→30分可	day1 (1-6コースまで) day1(1-6コースまで) day1,15 (1-6コースまで) day1 (7コース目から)	点滴 点滴 点滴 点滴	28(3剤併用)21(Bev維持)	中等度	卵巣がん
1487	BEVA/Olaparib	オラパリブ ペバシズマブ	600 15	mg/body mg/kg	分2 90→60→30分可	day1-21 day1	経口 点滴	21	最小度	卵巣がん
1528	ACT-D/VP-16 (EA)	エトポシド アクチノマイシシンD	100 0.5	mg/ml mg/body	150分 30分	day1,2,3 day1,2,3	点滴 点滴	14	中等度	絨毛性疾患(掲載外)
1569	NIVO(240)	ニボルマブ	240	mg/body	30分	day1	点滴	14	最小度	原発不明がん
1570	Pembrolizumab/Lenvatinib	ペムブロリズマブ レンパチニブ	200 20	mg/body mg/body	30分 分1	day1 連日	点滴	21	最小度	子宮体がん
1587	Pembrolizumab(q3w)	ペムブロリズマブ	200	mg/body	30分	day1	点滴	21	最小度	TMB-High固形がん
1588	Pembrolizumab(q6w)	ペムブロリズマブ	400	mg/body	30分	day1	点滴	42	最小度	TMB-High固形がん
1627	Pembrolizumab/CBDCA/PTX	ペムブロリズマブ パクリタキセル カルボプラチン	200 175 5	mg/body mg/ml AUC	30分 3時間 1時間	day1 day1 day1	点滴 点滴 点滴	21	中等度	子宮頸がん
1628	Pembrolizumab/BEVA/CBDCA/PTX	ペムブロリズマブ パクリタキセル カルボプラチン ペバシズマブ	200 175 5 15	mg/body mg/ml AUC mg/kg	30分 3時間 1時間 90→60→30分可	day1 day1 day1 day1	点滴 点滴 点滴 点滴	21	中等度	子宮頸がん
1629	Pembrolizumab/CDDP/PTX	ペムブロリズマブ パクリタキセル シスプラチン	200 175 50	mg/body mg/ml mg/ml	30分 3時間 2時間	day1 day1 day1	点滴 点滴 点滴	21	高度	子宮頸がん
1630	Pembrolizumab/BEVA/CDDP/PTX	ペムブロリズマブ パクリタキセル シスプラチン ペバシズマブ	200 175 50 15	mg/body mg/ml mg/ml mg/kg	30分 3時間 2時間 90→60→30分可	day1 day1 day1 day1	点滴 点滴 点滴 点滴	21	高度	子宮頸がん
1666	Cemiplimab	セミプリマブ	350	mg/body	30分	day1	点滴	21	最小度	子宮頸がん
1699	DXR	ドキシソルピシン	75	mg/ml	20分	day1	点滴	21	高度	骨軟部肉腫
1740	CBDCA/PTX(weekly)	パクリタキセル カルボプラチン	60 2	mg/ml AUC	60分 30分	day1,8,15 day1,8,15	点滴 点滴	21	中等度	卵巣がん
1780	Durvalumab/CBDCA/PTX(DUO-E/1-6コース目)	パクリタキセル カルボプラチン デュルバルマブ	175 6 1120	mg/ml AUC mg/body	3時間 30-60分 1時間	day1 day1 day1	点滴 点滴 点滴	21	中等度	子宮体がん
1781	Durvalumab/CBDCA/PTX(7コース目)	デュルバルマブ デュルバルマブ オラパリブ	1500 20 600	mg/body mg/kg mg/body	1時間 1時間 分2	day1 day1 day1-28	点滴 点滴 経口	28	最小度	子宮体がん
1782	wCDDP+Pembrolizumab(CCRT)(1+2コース目)	ペムブロリズマブ シスプラチン 放射線	200 40 -	mg/body mg/ml -	30分 2時間 -	day1.22 day1.8.15.22.29 週5回	点滴 点滴 -	42	高度	子宮頸がん
1783	wCDDP+Pembrolizumab(q3W)(CCRT)(3-5コース目)	ペムブロリズマブ 放射線	200 -	mg/body -	30分 -	day1 週5回	点滴 -	21	最小度	子宮頸がん
1784	wCDDP+Pembrolizumab(q6W)(CCRT)(6-15コース目)	ペムブロリズマブ	400	mg/body	30分	day1	点滴	42	最小度	子宮頸がん

No	電カル名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間 (日)	催吐リスク	がんの種類
1794	Pembrolizumab/CBDCA/PTX(1-6コース目)	ペムブロリズマブ バクリタキセル カルボプラチン	200 175 5	mg/body mg/m ² AUC	30分 3時間 1時間	day1 day1 day1	点滴 点滴 点滴	21	中等度	子宮体がん
1795	Pembrolizumab/CBDCA/PTX(7コース目以降)	ペムブロリズマブ	400	mg/body	30分	day1	点滴	42	最小度	子宮体がん
1829	Tisotumab Vedotin	チソツマブ ベドチン	2	mg/kg	30分以上	day1	点滴	21	軽度	子宮頸がん
1928	DXR	ドキシソルピシン	60	mg/m ²	20分	day1	点滴	21	高度	子宮体がん