

No	電カル名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間 (日)	催吐リスク	がんの種類
5	GEM	ゲムシタビン	1000	mg/m <sup>2</sup>	30分	day1,8,15	点滴	28	軽度	胆道がん
379	CPT-11(B法)	イリノテカン	150	mg/m <sup>2</sup>	90分	day1	点滴	2週間隔で2-3回投与後 21日間休薬	中等度	胃がん/大腸がん
389	mFOLFOX6	オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	85 200 400 2400	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	2時間 2時間 急速 46時間 (5ml/hr)	day1 day1 day1 day1-2	点滴 点滴 点滴 点滴	14	中等度	大腸がん
613	wPTX(q4w)	パクリタキセル	80	mg/m <sup>2</sup>	1時間	day1,8,15	点滴	28	軽度	胃がん
743	CAPE/I-OHP(Xelox)	オキサリプラチン カペシタビン	130 2000	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	2時間 分2(朝・夕食後)	day1 day1-14	点滴 経口	21	中等度	大腸がん
876	nab-PTX	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	260	mg/m <sup>2</sup>	30分	day1	点滴	21	軽度	胃がん
996	CAPE/I-OHP(G-XELOX)	オキサリプラチン カペシタビン	130 2000	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	2時間 分2(朝・夕食後)	day1 day1-14	点滴 経口	21	中等度	胃がん
997	I-OHP/S-1(G-SOX)	S-1 オキサリプラチン	120 100	mg/body mg/m <sup>2</sup>	分2(朝・夕食後) 2時間	day1-14 day1	経口 点滴	21	中等度	胃がん
1062	RAM	ラムシルマブ	8	mg/kg	60分 (2回目以降30分可)	day1	点滴	14	最小度	胃がん
1063	RAM/PTX	ラムシルマブ パクリタキセル	8 80	mg/kg mg/m <sup>2</sup>	60分 (2回目以降30分可) 1時間	day1,15 day1,8,15	点滴 点滴	28	軽度	胃がん
1242	nab-PTX/Ram	ラムシルマブ パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	8 100	mg/kg mg/m <sup>2</sup>	60分 (2回目以降30分可) 30分	day1,15 day1,8,15	点滴 点滴	28	軽度	胃がん
1249	DOC/TS-1	S-1  ドセタキセル	120  40	mg/body  mg/m <sup>2</sup>	分2(朝・夕食後)  1時間	day1-14 (1~7コース目) (8コース目以降4週内服2週休薬) day1 (2~7コース目)	経口  点滴	21	軽度	胃がん
1260	NIVO(240)	ニボルマブ	240	mg/body	30分	day1	点滴	14	最小度	胃がん
1449	NIVO(480/q4w)	ニボルマブ	480	mg/body	30分	day1	点滴	28	最小度	胃がん
1489	RAM/TAS-102	トリフルリジン・チピラシル ラムシルマブ	70 8	mg/m <sup>2</sup> mg/kg	分2(朝・夕食後) 60分 (2回目以降30分可)	day1-5,8-12 day1,15	経口 点滴	28	中等度	胃がん
1546	CET/Enco(BEACON)	セツキシマブ セツキシマブ エンコラフェニブ	400 250 300	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/body	2時間 1時間 分1	day1 (1コース目のみ) day1 (2コース目以降) day1-7	点滴 点滴 経口	7	中等度	大腸がん
1547	CET/Bini/Enco(BEACON)	セツキシマブ セツキシマブ エンコラフェニブ ピニメチニブ	400 250 300 90	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/body mg/body	2時間 1時間 分1 分2	day1 (1コース目のみ) day1 (2コース目以降) day1-7 day1-7	点滴 点滴 経口 経口	7	中等度	大腸がん
1557	NIVO/I-OHP/S-1(G-SOX)	S-1 オキサリプラチン ニボルマブ	80 100 360	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/body	分2(朝・夕食後) 2時間 30分	day1-14 day1 day1	経口 点滴 点滴	21	中等度	胃がん
1558	NIVO/CAPE/I-OHP(G-XELOX)	カペシタビン オキサリプラチン ニボルマブ	2000 130 360	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/body	分2(朝・夕食後) 2時間 30分	day1-14 day1 day1	経口 点滴 点滴	21	中等度	胃がん

No	電カル名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間 (日)	催吐リスク	がんの種類
1559	NIVO/mFOLFOX6	オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル ニボルマブ	85 200 400 2400 240	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/body	2時間 2時間 急速 46時間 (5ml/hr) 30分	day1 day1 day1 day1-2 day1	点滴 点滴 点滴 点滴 点滴	14	中等度	胃がん
1560	CPT-11/RAM	イリノテカン ラムシルマブ	150 8	mg/m <sup>2</sup> mg/kg	90分 60分 (2回目以降30分可)	day1 day1	点滴 点滴	14	中等度	胃がん