

| No | 電カル名 | 一般名 | 基本投与量 | 単位 | 投与時間 | 投与日 | 投与経路 | コース期間(日) | 催吐リスク | がんの種類 |
|-----|--------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|------------------------|------------|----------|
| 5 | GEM | ゲムシタピン | 1000 | mg/m ² | 30分 | day1,8,15 | 点滴 | 28 | 軽度 | 胆道がん |
| 6 | GEM | ゲムシタピン | 1000 | mg/m ² | 30分 | day1,8,15 | 点滴 | 28 | 軽度 | 膵がん |
| 161 | GEM/S-1 | ゲムシタピン S-1 | 1000 80 | mg/m ² mg/m ² | 30分 分2(朝・夕食後) | day1,8 day1-14 | 点滴 経口 | 21 | 軽度 | 胆道がん |
| 163 | DTX | ドセタキセル | 70 | mg/m ² | 90分 | day1 | 点滴 | 21-28 | 軽度 | 食道がん |
| 317 | CDDP/PEM | ペメトレキセド シスプラチン | 500 75 | mg/m ² mg/m ² | 10分 1-2時間 | day1 day1 | 点滴 点滴 | 21 | 高度 | 胸膜中皮腫 |
| 378 | CDDP+CPT-11(B法) | シスプラチン イリノテカン | 80 70 | mg/m ² mg/m ² | 1時間 90分 | day1 day1,8 | 点滴 点滴 | 28 | 高度 | 胃がん |
| 379 | CPT-11(B法) | イリノテカン | 150 | mg/m ² | 90分 | day1 | 点滴 | 2週間隔で2-3回投与後 21日間休薬 | 中等度 | 胃がん/大腸がん |
| 388 | mFOLFIRI | イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル | 150 200 400 2400 | mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² | 2時間 2時間 急速 46時間 (5ml/hr) | day1 day1 day1 day1-2 | 点滴 点滴 点滴 点滴 | 14 | 中等度 | 大腸がん |
| 389 | mFOLFOX6 | オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル | 85 200 400 2400 | mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² | 2時間 2時間 急速 46時間 (5ml/hr) | day1 day1 day1 day1-2 | 点滴 点滴 点滴 点滴 | 14 | 中等度 | 大腸がん |
| 479 | 5-FU/CDDP(standard FP) | フルオロウラシル シスプラチン | 800 80 | mg/m ² mg/m ² | 24時間 2時間 | day1-5 day1 | 点滴 点滴 | 28 | 高度 | 食道がん |
| 496 | BEVA/CAPE/I-OHP(Xelox) | ベバシズマブ オキサリプラチン カベシタピン | 7.5 130 2000 | mg/kg mg/m ² mg/m ² | 90→60→30分 2時間 分2(朝・夕食後) | day1 day1 day1-14 | 点滴 点滴 経口 | 21 | 中等度 | 大腸がん |
| 613 | wPTX(q4w) | パクリタキセル | 80 | mg/m ² | 1時間 | day1,8,15 | 点滴 | 28 | 軽度 | 胃がん |
| 616 | BEVA/CAPE/CPT-11(XELIRI) | ベバシズマブ イリノテカン カベシタピン | 7.5 200 1600 | mg/kg mg/m ² mg/m ² | 90→60→30分 2時間 分2(朝・夕食後) | day1 day1 day1-14 | 点滴 点滴 経口 | 21 | 中等度 | 大腸がん |
| 642 | CET | セツキシマブ セツキシマブ | 400 250 | mg/m ² mg/m ² | 2時間 1時間 | day1 (1コース目のみ) day1 (2コース目以降) | 点滴 点滴 | 7 7 | 最小度 最小度 | 大腸がん |
| 657 | PANI | パニツムマブ | 6 | mg/kg | 1時間 | day1 | 点滴 | 14 | 最小度 | 大腸がん |
| 660 | PANI/mFOLFOX | パニツムマブ オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル | 6 85 200 400 2400 | mg/kg mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² | 1時間 2時間 2時間 急速 46時間 (5ml/hr) | day1 day1 day1 day1 day1-2 | 点滴 点滴 点滴 点滴 点滴 | 14 | 中等度 | 大腸がん |
| 661 | BEVA/CPT-11/S-1 | S-1 イリノテカン ベバシズマブ | 80 150 7.5 | mg/m ² mg/m ² mg/kg | 分2(朝・夕食後) 90分-120分 90→60→30分 | day1-14 day1 day1 | 経口 点滴 点滴 | 21 | 中等度 | 大腸がん |
| 662 | BEVA/SOX | S-1 オキサリプラチン ベバシズマブ | 80 130 7.5 | mg/m ² mg/m ² mg/kg | 分2(朝・夕食後) 90分-120分 90→60→30分 | day1-14 day1 day1 | 経口 点滴 点滴 | 21 | 中等度 | 大腸がん |

| No | 電カル名 | 一般名 | 基本投与量 | 単位 | 投与時間 | 投与日 | 投与経路 | コース期間(日) | 催吐リスク | がんの種類 |
|-----|-----------------------|---|---------------------------------|---|--|---|----------------------------|----------|-------|-------|
| 663 | BEVA(5)/mFOLFIRI | ベバスズマブ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル | 5 150 200 400 2400 | mg/kg mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² | 90→60→30分可 2時間 2時間 急速 46時間(5ml/hr) | day1 day1 day1 day1 day1-2 | 点滴 点滴 点滴 点滴 点滴 | 14 | 中等度 | 大腸がん |
| 675 | CDDP/GEM | シスプラチン ゲムシタピン | 25 1000 | mg/m ² mg/m ² | 1時間 30分 | day1,8 day1,8 | 点滴 点滴 | 21 | 高度 | 胆道がん |
| 677 | CET/CPT-11(bi-weekly) | セツキシマブ セツキシマブ セツキシマブ イリノテカン | 400 250 500 150 | mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² | 2時間 1時間 2時間 90分 | day1(1コース目のみ) day8(1コース目のみ) day1(2コース目以降) day1 | 点滴 点滴 点滴 点滴 | 14 | 中等度 | 大腸がん |
| 719 | BEVA/CAPE | ベバスズマブ カベシタピン | 7.5 2500 | mg/kg mg/m ² | 90→60→30分可 分2(朝・夕食後) | day1 day1-14 | 点滴 経口 | 21 | 軽度 | 大腸がん |
| 720 | CAPE/CDDP/HER | シスプラチン トラスツズマブ トラスツズマブ カベシタピン | 80 8 6 2000 | mg/m ² mg/kg mg/kg mg/m ² | 2時間 90分(2回目を以降30分可) 90分(2回目を以降30分可) 分2(朝・夕食後) | day1 day1 day1 day1-14 | 点滴 点滴 点滴 経口 | 21 | 高度 | 胃がん |
| 743 | CAPE/l-OHP(Xelox) | オキサリプラチン カベシタピン | 130 2000 | mg/m ² mg/m ² | 2時間 分2(朝・夕食後) | day1 day1-14 | 点滴 経口 | 21 | 中等度 | 大腸がん |
| 802 | BEVA/mFOLFOX6 | ベバスズマブ オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル | 5 85 200 400 2400 | mg/kg mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² | 90→60→30分可 2時間 2時間 急速 46時間(5ml/hr) | day1 day1 day1 day1 day1-2 | 点滴 点滴 点滴 点滴 点滴 | 14 | 中等度 | 大腸がん |
| 840 | wPTX(q7W) | パクリタキセル | 100 | mg/m ² | 1時間 | day1,8,15,22,29,36 | 点滴 | 49 | 軽度 | 食道がん |
| 876 | nab-PTX | パクリタキセル(アルブミン懸濁型) | 260 | mg/m ² | 30分 | day1 | 点滴 | 21 | 軽度 | 胃がん |
| 895 | 登録なし | S-1 シスプラチン トラスツズマブ トラスツズマブ | 120 60 8 6 | mg/body mg/m ² mg/kg mg/kg | 分2(朝・夕食後) 2時間 90分(2回目を以降30分可) 90分(2回目を以降30分可) | day1-14 day1 day1 day1 | 経口 点滴 点滴 点滴 | 21 | 高度 | 胃がん |
| 911 | 登録なし | パクリタキセル トラスツズマブ トラスツズマブ | 80 8 6 | mg/m ² mg/kg mg/kg | 1時間 90分(2回目を以降30分可) 90分(2回目を以降30分可) | day1,8,15 day1 day1 | 点滴 点滴 点滴 | 28 21 | 軽度 | 胃がん |
| 960 | FOLFIRINOX | オキサリプラチン イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル | 85 180 200 400 2400 | mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² | 2時間 90分 2時間 急速静注 46時間 | day1 day1 day1 day1 day1-2 | 点滴 点滴 点滴 静注 点滴 | 14 | 高度 | 膵がん |
| 970 | FOLFOXIRI | イリノテカン オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル | 165 85 200 3200 | mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² | 1時間 2時間 2時間 48時間(5ml/hr) | day1 day1 day1 day1-2 | 点滴 点滴 点滴 点滴 | 14 | 高度 | 大腸がん |

| No | 電カル名 | 一般名 | 基本投与量 | 単位 | 投与時間 | 投与日 | 投与経路 | コース期間(日) | 催吐リスク | がんの種類 |
|------|-----------------------|---|---|--|--|---|----------------------------------|----------|-------|-------|
| 971 | BEVA/FOLFOXIRI | ベバスズマブ イリノテカン オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル | 5 165 85 200 3200 | mg/kg mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² | 90→60→30分可 1時間 2時間 2時間 48時間 (5ml/hr) | day1 day1 day1 day1 day1-2 | 点滴 点滴 点滴 点滴 点滴 | 14 | 高度 | 大腸がん |
| 984 | PANI/CPT-11 | イリノテカン パニツムマブ | 150 6 | mg/m ² mg/kg | 90分 1時間 | day1 day1 | 点滴 点滴 | 14 | 中等度 | 大腸がん |
| 996 | CAPE/I-OHP(G-XELOX) | オキサリプラチン カベシタピン | 130 2000 | mg/m ² mg/m ² | 2時間 分2(朝・夕食後) | day1 day1-14 | 点滴 経口 | 21 | 中等度 | 胃がん |
| 997 | I-OHP/S-1(G-SOX) | S-1 オキサリプラチン | 120 100 | mg/body mg/m ² | 分2(朝・夕食後) 2時間 | day1-14 day1 | 経口 点滴 | 21 | 中等度 | 胃がん |
| 1039 | GEM/nab-PTX | ゲムシタピン バクリタキセル(アルブミン懸濁型) | 1000 125 | mg/m ² mg/m ² | 30分 30分 | day1,8,15 day1,8,15 | 点滴 点滴 | 28 | 中等度 | 膵がん |
| 1062 | RAM | ラムシルマブ | 8 | mg/kg | 60分 (2回目を以降30分可) | day1 | 点滴 | 14 | 最小度 | 胃がん |
| 1063 | RAM/PTX | ラムシルマブ バクリタキセル | 8 80 | mg/kg mg/m ² | 60分 (2回目を以降30分可) 1時間 | day1,15 day1,8,15 | 点滴 点滴 | 28 | 軽度 | 胃がん |
| 1105 | 5-FU/CDGP | フルオロウラシル ネダプラチン | 800 90 | mg/m ² mg/m ² | 24時間 2時間 | day1-5 day1 | 点滴 点滴 | 28 | 中等度 | 食道がん |
| 1106 | CET/CPT-11 | セツキシマブ セツキシマブ イリノテカン | 400 250 150 | mg/m ² mg/m ² mg/m ² | 2時間 1時間 90分 | day1 (1コース目のみ) day1,8 (2コース目を以降) day1 | 点滴 点滴 点滴 | 14 | 中等度 | 大腸がん |
| 1117 | HER/CAPE/I-OHP(XELOX) | カベシタピン オキサリプラチン トラスツズマブ トラスツズマブ | 2000 130 8 6 | mg/m ² mg/m ² mg/kg mg/kg | 分2(朝・夕食後) 2時間 90分 (2回目を以降30分可) 90分 (2回目を以降30分可) | day1-14 day1 day1 day1 | 経口 点滴 点滴 点滴 | 21 | 中等度 | 胃がん |
| 1141 | CPT-11/S-1(IRIS)(q4w) | S-1 イリノテカン | 80 125 | mg/m ² mg/m ² | 分2(朝・夕食後) 90分 | day1-14 day1,15 | 経口 点滴 | 28 | 中等度 | 大腸がん |
| 1146 | RAM+mFOLFIRI | ラムシルマブ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル | 8 150 200 400 2400 | mg/kg mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² | 60分 (2回目を以降30分可) 2時間 2時間 急速 46時間 (5ml/hr) | day1 day1 day1 day1 day1-2 | 点滴 点滴 点滴 点滴 点滴 | 14 | 中等度 | 大腸がん |
| 1167 | mFOLFOX6 | オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル | 85 200 400 2400 | mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² | 2時間 2時間 急速 46時間 (5ml/hr) | day1 day1 day1 day1-2 | 点滴 点滴 点滴 点滴 | 14 | 中等度 | 胃がん |
| 1192 | BEVA/TAS-102 | ベバスズマブ トリフルリジン・チピラシル | 5 70 | mg/kg mg/m ² | 90→60→30分可 分2(朝・夕食後) | day1,15 day1-5,8-12 | 点滴 経口 | 28 | 中等度 | 大腸がん |
| 1217 | CET/mFOLFIRI | セツキシマブ セツキシマブ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル | 400 250 150 200 400 2400 | mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² | 2時間 1時間 2時間 2時間 急速 46時間 (5ml/hr) | day1 (1コース目のみ) day1,8 (2コース目を以降) day1 day1 day1 day1-2 | 点滴 点滴 点滴 点滴 点滴 点滴 | 14 | 中等度 | 大腸がん |

| No | 電カル名 | 一般名 | 基本投与量 | 単位 | 投与時間 | 投与日 | 投与経路 | コース期間(日) | 催吐リスク | がんの種類 |
|------|--|---|--------------------------------|---|--|---|----------------------------|----------|-------|--------------|
| 1240 | AFL/mFOLFIRI | アフリベルセプト ベータ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル | 4 150 200 400 2400 | mg/kg mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² | 1時間 2時間 2時間 急速 46時間 (5ml/hr) | day1 day1 day1 day1 day1-2 | 点滴 点滴 点滴 点滴 点滴 | 14 | 中等度 | 大腸がん |
| 1242 | nab-PTX/Ram | ラムシルマブ バクリタキセル(アルブミン懸濁型) | 8 100 | mg/kg mg/m ² | 60分 (2回目を以降30分可) 30分 | day1,15 day1,8,15 | 点滴 点滴 | 28 | 軽度 | 胃がん |
| 1249 | DOC/TS-1 | S-1 ドセタキセル | 120 40 | mg/body mg/m ² | 分2(朝・夕食後) 1時間 | day1-14 (1~7コース目) (8コース目を以降4週内服2週休薬) day1 (2~7コース目) | 経口 点滴 | 21 | 軽度 | 胃がん |
| 1260 | NIVO(240) | ニボルマブ | 240 | mg/body | 30分 | day1 | 点滴 | 14 | 最小度 | 胃がん |
| 1294 | Pembrolizumab | ペムブロリズマブ | 200 | mg/body | 30分 | day1 | 点滴 | 21 | 最小度 | MSI-High固形がん |
| 1312 | FOLFOX6(外来)(食道) FOLFOX6(入院)(食道) | フルオロウラシル フルオロウラシル レボホリナート オキサリプラチン | 2400 400 200 85 | mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² | 46時間 5分 2時間 2時間 | day1 day1 day1 day1 | 点滴 静注 点滴 点滴 | 14 | 中等度 | 食道がん |
| 1313 | FOLFOX6(CCRT)(外来)(食道) FOLFOX6(CCRT)(入院)(食道) | フルオロウラシル フルオロウラシル レボホリナート オキサリプラチン 放射線 | 1600 400 200 85 50 | mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² Gy/25fr | 46時間 5分 2時間 2時間 - | day1 day1 day1 day1 - | 点滴 静注 点滴 点滴 - | 14 | 中等度 | 食道がん |
| 1329 | RAM | ラムシルマブ | 8 | mg/kg | 60分 (2回目を以降30分可) | day1 | 点滴 | 14 | 最小度 | 肝臓がん |
| 1331 | mFOLFIRINOX | オキサリプラチン イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル | 85 150 200 2400 | mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² | 2時間 90分 2時間 46時間 (5ml/hr) | day1 day1 day1 day1-2 | 点滴 点滴 点滴 点滴 | 14 | 高度 | 膵がん |
| 1378 | NIVO(240) | ニボルマブ | 240 | mg/body | 30分 | day1 | 点滴 | 14 | 最小度 | 食道がん |
| 1391 | I-OHP/S-1/HER(HER/SOX) | S-1 オキサリプラチン トラスツズマブ トラスツズマブ | 120 100 8 6 | mg/body mg/m ² mg/kg mg/kg | 分2(朝・夕食後) 2時間 90分 (2回目を以降30分可) 90分 (2回目を以降30分可) | day1-14 day1 day1 day1 | 経口 点滴 点滴 点滴 | 21 | 中等度 | 胃がん |
| 1392 | BEVA/CPT-11/S-1(q4w) | S-1 イリノテカン ペバシズマブ | 80 100 5 | mg/m ² mg/m ² mg/kg | 分2(朝・夕食後) 90分 90→60→30分可 | day1-14 day1,15 day1,15 | 経口 点滴 点滴 | 28 | 中等度 | 大腸がん |
| 1398 | 5FU/CDDP/RT(肛門管癌) | シスプラチン フルオロウラシル | 75 1000 | mg/m ² mg/m ² | 2時間 24時間 | day1 day1-4 | 点滴 点滴 | 28 | 高度 | 大腸がん |
| 1403 | nal-IRI/5FU/I-LV | イリノテカン塩酸塩水和物 リボソーム製剤 レボホリナート フルオロウラシル | 70 200 2400 | mg/m ² mg/m ² mg/m ² | 90分 2時間 46時間 | day1 day1 day1-2 | 点滴 点滴 点滴 | 14 | 中等度 | 膵がん |
| 1424 | Pembrolizumab(q3w) | ペムブロリズマブ | 200 | mg/body | 30分 | day1 | 点滴 | 21 | 最小度 | 食道がん |
| 1425 | Pembrolizumab(q6w) | ペムブロリズマブ | 400 | mg/body | 30分 | day1 | 点滴 | 42 | 最小度 | 食道がん |
| 1428 | Atezolizumab/BEVA | アテゾリズマブ ペバシズマブ | 1200 15 | mg/body mg/kg | 60分 (2回目を以降30分可) 90→60→30分可 | day1 day1 | 点滴 点滴 | 21 | 軽度 | 肝臓がん |
| 1434 | Pembrolizumab (q6w) | ペムブロリズマブ | 400 | mg/body | 30分 | day1 | 点滴 | 42 | 最小度 | MSI-High固形がん |
| 1438 | NIVO(480/q4w) | ニボルマブ | 480 | mg/body | 30分 | day1 | 点滴 | 28 | 最小度 | 食道がん |

| No | 電カル名 | 一般名 | 基本投与量 | 単位 | 投与時間 | 投与日 | 投与経路 | コース期間(日) | 催吐リスク | がんの種類 |
|------|--------------------------|--|---------------------------------|---|--|---|----------------------------|----------|-------|--------|
| 1446 | 5FU/CDDP/RT(JCOG0909) | シスプラチン フルオロウラシル 放射線 | 75 1000 50.4 | mg/m ² mg/m ² Gy/28fr | 2時間 24時間 - | day1 day1-4 | 点滴 点滴 | 28 | 高度 | 食道がん |
| 1449 | NIVO(480/q4w) | ニボルマブ | 480 | mg/body | 30分 | day1 | 点滴 | 28 | 最小度 | 胃がん |
| 1450 | ENHERTU | トラスツズマブ デルクステカン | 6.4 | mg/kg | 90分 (2回目を以降30分可) | day1 | 点滴 | 21 | 中等度 | 胃がん |
| 1489 | RAM/TAS-102 | トリフルリジン・チピラシル ラムシルマブ | 70 8 | mg/m ² mg/kg | 分2(朝・夕食後) 60分 (2回目を以降30分可) | day1-5,8-12 day1,15 | 経口 点滴 | 28 | 中等度 | 胃がん |
| 1546 | CET/Enco(BEACON) | セツキシマブ セツキシマブ エンコラフェニブ | 400 250 300 | mg/m ² mg/m ² mg/body | 2時間 1時間 分1 | day1 (1コース目のみ) day1 (2コース目を以降) day1-7 | 点滴 点滴 経口 | 7 | 中等度 | 大腸がん |
| 1547 | CET/Bini/Enco(BEACON) | セツキシマブ セツキシマブ エンコラフェニブ ピニメチニブ | 400 250 300 90 | mg/m ² mg/m ² mg/body mg/body | 2時間 1時間 分1 分2 | day1 (1コース目のみ) day1 (2コース目を以降) day1-7 day1-7 | 点滴 点滴 経口 経口 | 7 | 中等度 | 大腸がん |
| 1555 | CCDP/GEM/S-1(GCS) | ゲムシタピン シスプラチン S-1 | 1000 25 80 | mg/m ² mg/m ² mg/m ² | 30分 1時間 分2(朝・夕食後) | day1 day1 day1-7 | 点滴 点滴 経口 | 14 | 高度 | 胆道がん |
| 1557 | NIVO/l-OHP/S-1(G-SOX) | S-1 オキサリプラチン ニボルマブ | 80 100 360 | mg/m ² mg/m ² mg/body | 分2(朝・夕食後) 2時間 30分 | day1-14 day1 day1 | 経口 点滴 点滴 | 21 | 中等度 | 胃がん |
| 1558 | NIVO/CAPE/l-OHP(G-XELOX) | カベシタピン オキサリプラチン ニボルマブ | 2000 130 360 | mg/m ² mg/m ² mg/body | 分2(朝・夕食後) 2時間 30分 | day1-14 day1 day1 | 経口 点滴 点滴 | 21 | 中等度 | 胃がん |
| 1559 | NIVO/mFOLFOX6 | オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル ニボルマブ | 85 200 400 2400 240 | mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/body | 2時間 2時間 急速 46時間 (5ml/hr) 30分 | day1 day1 day1 day1-2 day1 | 点滴 点滴 点滴 点滴 点滴 | 14 | 中等度 | 胃がん |
| 1560 | CPT-11/RAM | イリノテカン ラムシルマブ | 150 8 | mg/m ² mg/kg | 90分 60分 (2回目を以降30分可) | day1 day1 | 点滴 点滴 | 14 | 中等度 | 胃がん |
| 1564 | Pembrolizumab/5-FU/CDDP | ペムブロリズマブ シスプラチン フルオロウラシル | 200 80 800 | mg/body mg/m ² mg/m ² | 30分 2時間 24時間 | day1 day1 day1-5 | 点滴 点滴 点滴 | 21 | 高度 | 食道がん |
| 1569 | NIVO(240) | ニボルマブ | 240 | mg/body | 30分 | day1 | 点滴 | 14 | 最小度 | 原発不明がん |
| 1575 | BEVA/mFOLFOXIRI | ベバシズマブ イリノテカン オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル | 5 150 85 200 2400 | mg/kg mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² | 90→60→30分可 1時間 2時間 2時間 46時間 (5ml/hr) | day1 day1 day1 day1 day1-2 | 点滴 点滴 点滴 点滴 点滴 | 14 | 高度 | 大腸がん |
| 1578 | 5-FU/CDDP/DOC(DCF) | シスプラチン フルオロウラシル ドセタキセル | 70 750 70 | mg/m ² mg/m ² mg/m ² | 2時間 24時間 1時間 | day1 day1-5 day1 | 点滴 点滴 点滴 | 21 | 高度 | 食道がん |
| 1579 | mFOLFOXIRI | イリノテカン オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル | 150 85 200 2400 | mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² | 1時間 2時間 2時間 46時間 (5ml/hr) | day1 day1 day1 day1-2 | 点滴 点滴 点滴 点滴 | 14 | 高度 | 大腸がん |

| No | 電カル名 | 一般名 | 基本投与量 | 単位 | 投与時間 | 投与日 | 投与経路 | コース期間(日) | 催吐リスク | がんの種類 |
|------|------------------------|---|------------------------------------|---|--|--|----------------------------------|---|-------|-------|
| 1595 | HP | ベルツズマブ ベルツズマブ トラスツズマブ トラスツズマブ | 840 420 8 6 | mg/body mg/body mg/kg mg/kg | 1時間 (2回目を以降30分可) 1時間 (2回目を以降30分可) 90分 (2回目を以降30分可) 90分 (2回目を以降30分可) | day1(初回または3週以上遅延時) day1(2回目を以降) day1(初回または1週超え遅延時) day1(2回目を以降) | 点滴 点滴 点滴 点滴 | 21 | 軽度 | 大腸がん |
| 1601 | NIVO/5-FU/CDDP | シスプラチン フルオロウラシル ニボルマブ | 80 800 480 | mg/m ² mg/m ² mg/body | 2時間 24時間 30分 | day1 day1-5 day1 | 点滴 点滴 点滴 | 28 | 高度 | 食道がん |
| 1614 | HER/mFOLFOX6 | オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル トラスツズマブ トラスツズマブ | 85 200 400 2400 8 6 | mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/kg mg/kg | 2時間 2時間 急速 46時間 (5ml/hr) 90分 (2回目を以降30分可) 90分 (2回目を以降30分可) | day1 day1 day1 day1-2 day1(初回または1週超え遅延時) day1(2回目を以降) | 点滴 点滴 点滴 点滴 点滴 点滴 | 14 | 中等度 | 胃がん |
| 1635 | Ipilimumab/NIVO | ニボルマブ イピリムマブ | 360 1 | mg/body mg/kg | 30分 30分 | day1,22 day1 | 点滴 点滴 | 42 | 最小度 | 食道がん |
| 1638 | CET(q2w)/FOLFIRI | イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル セツキシマブ | 150 200 400 2400 500 | mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² | 2時間 2時間 急速 46時間 (5ml/hr) 2時間 | day1 day1 day1 day1-2 day1 | 点滴 点滴 点滴 点滴 点滴 | 14 | 中等度 | 大腸がん |
| 1639 | CET(q2w)/mFOLFOX6 | オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル セツキシマブ | 85 200 400 2400 500 | mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² | 2時間 2時間 急速 46時間 (5ml/hr) 2時間 | day1 day1 day1 day1-2 day1 | 点滴 点滴 点滴 点滴 点滴 | 14 | 中等度 | 大腸がん |
| 1644 | Durvalumab/CDDP/GEM | ゲムシタピン シスプラチン デュルバルマブ デュルバルマブ | 1000 25 1500 20 | mg/m ² mg/m ² mg/body mg/kg | 30分 1時間 1時間 1時間 | day1,8 day1,8 day1 day1 | 点滴 点滴 点滴 点滴 | 9コース目を以降 Durvalumabのみ 4週間毎でPDまで継続 | 高度 | 胆道がん |
| 1646 | Durvalumab | デュルバルマブ デュルバルマブ | 1500 20 | mg/body mg/kg | 1時間 1時間 | day1 day1 | 点滴 点滴 | 28 | 最小度 | 肝臓がん |
| 1647 | なし (肝動注) | ミリプラチン | 腫瘍血管に 懸濁液が充満するまで (最大120) | mg/body | | day1 | 肝動注 | 28 | 中等度 | 肝臓がん |
| 1657 | Durva/Treme | トレメリマブ トレメリマブ デュルバルマブ デュルバルマブ | 300 4 1500 20 | mg/body mg/kg mg/body mg/kg | 1時間 1時間 1時間 1時間 | day1(1コース目のみ) day1(1コース目のみ) day1 day1 | 点滴 点滴 点滴 点滴 | 28 | 最小度 | 肝臓がん |
| 1716 | PHESGO | フェスゴ フェスゴ | 15 10 | mL/body mL/body | 8分 5分 | day1(初回または6週以上遅延時) day1(2回目を以降) | 皮下注 皮下注 | 21 | 最小度 | 大腸がん |
| 1744 | Pembrolizumab/CDDP/GEM | ゲムシタピン シスプラチン ペムブロリズマブ | 1000 25 200 | mg/m ² mg/m ² mg/body | 30分 1時間 30分 | day1,8 day1,8 day1 | 点滴 点滴 点滴 | 21 | 高度 | 胆道がん |

| No | 電カル名 | 一般名 | 基本投与量 | 単位 | 投与時間 | 投与日 | 投与経路 | コース期間(日) | 催吐リスク | がんの種類 |
|------|-----------------------------------|---|--|--|---|--|----------------------------------|----------|-------|-------|
| 1751 | Pembrolizumab/CAPE/I-OHP(G-XELOX) | カベシタピン オキサリプラチン ペムブロリズマブ | 2000 130 200 | mg/m ² mg/m ² mg/body | 分2(朝・夕食後) 2時間 30分 | day1-14 day1 day1 | 経口 点滴 点滴 | 21 | 中等度 | 胃がん |
| 1752 | Pembrolizumab/CAPE/I-OHP(G-XELOX) | S-1 オキサリプラチン ペムブロリズマブ | 80 100 200 | mg/m ² mg/m ² mg/body | 分2(朝・夕食後) 2時間 30分 | day1-14 day1 day1 | 経口 点滴 点滴 | 21 | 中等度 | 胃がん |
| 1755 | 5-FU/CDDP(NAC) | フルオロウラシル シスプラチン | 800 80 | mg/m ² mg/m ² | 24時間 2時間 | day1-5 day1 | 点滴 点滴 | 21 | 高度 | 食道がん |
| 1759 | ZOL/CAPE/I-OHP(XELOX) | カベシタピン オキサリプラチン ゾルベツキシマブ ゾルベツキシマブ | 2000 130 800 600 | mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² | 分2(朝・夕食後) 2時間 添付文書参照 添付文書参照 | day1-14 day1 day1 day1 | 経口 点滴 点滴 点滴 | 21 | 高度 | 胃がん |
| 1760 | ZOL/mFOLFOX6 | オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル ゾルベツキシマブ ゾルベツキシマブ | 85 200 400 2400 800 400 | mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² | 2時間 2時間 急速 46時間 添付文書参照 2時間 | day1 day1 day1 day1-2 day1 day1 | 点滴 点滴 点滴 点滴 点滴 点滴 | 14 | 高度 | 胃がん |
| 1770 | Ipilimumab/NIVO | ニボルマブ イビリムマブ | 240 1 | mg/body mg/kg | 30分 30分 | day1 day1 | 点滴 点滴 | 21 | 最小度 | 大腸がん |
| 1830 | Pembrolizumab/HER/G-SOX | S-1 オキサリプラチン トラスツズマブ トラスツズマブ ペムブロリズマブ | 80 100 8 6 200 | mg/m ² mg/m ² mg/kg mg/kg mg/body | 分2(朝・夕食後) 2時間 90分(2回目を以降30分可) 90分(2回目を以降30分可) 30分 | day1-14 day1 day1 day1 day1 | 経口 点滴 点滴 点滴 点滴 | 21 | 中等度 | 胃がん |
| 1830 | Pembrolizumab/HER/XELOX | カベシタピン オキサリプラチン トラスツズマブ トラスツズマブ ペムブロリズマブ | 2000 130 8 6 200 | mg/m ² mg/m ² mg/kg mg/kg mg/body | 分2(朝・夕食後) 2時間 90分(2回目を以降30分可) 90分(2回目を以降30分可) 30分 | day1-14 day1 day1 day1 day1 | 経口 点滴 点滴 点滴 点滴 | 21 | 中等度 | 胃がん |
| 1849 | Ipilimumab/NIVO | イビリムマブ ニボルマブ ニボルマブ ニボルマブ | 3 80 240 480 | mg/kg mg/body mg/body mg/body | 30分 30分 30分 30分 | day1 day1 day1 day1 | 点滴 点滴 点滴 点滴 | 21 | 最小度 | 肝臓がん |
| 1853 | CET/Bini/Enco(BEACON)(bi-weekly) | セツキシマブ エンコラフェニブ ビニメチニブ | 500 300 90 | mg/m ² mg/body mg/body | 2時間 分1 分2 | day1 連日 連日 | 点滴 経口 経口 | 14 | 最小度 | 大腸がん |
| 1854 | ZOL/S-1/I-OHP(SOX) | S-1 オキサリプラチン ゾルベツキシマブ ゾルベツキシマブ | 80 130 800 600 | mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² | 分2(朝・夕食後) 2時間 添付文書参照 添付文書参照 | day1-14 day1 day1 day1 | 経口 点滴 点滴 点滴 | 21 | 高度 | 胃がん |
| 1878 | PANI/Sotorasib | パニツムマブ | 6 | mg/kg | 1時間 | day1,15 | 点滴 | 28 | 最小度 | 大腸がん |

| No | 電カル名 | 一般名 | 基本投与量 | 単位 | 投与時間 | 投与日 | 投与経路 | コース期間(日) | 催吐リスク | がんの種類 |
|------|------------------------|----------|-------|-------------------|------|-----------|------|----------|-------|-------|
| 1898 | CET/Enco/mFOLFOX6 | オキサリプラチン | 85 | mg/m ² | 2時間 | day1 | 点滴 | 14 | 中等度 | 大腸がん |
| | | レボホリナート | 200 | mg/m ² | 2時間 | day1 | 点滴 | | | |
| | | フルオロウラシル | 400 | mg/m ² | 急速 | day1 | 点滴 | | | |
| | | フルオロウラシル | 2400 | mg/m ² | 46時間 | day1-3 | 点滴 | | | |
| | | セツキシマブ | 500 | mg/m ² | 2時間 | day1 | 点滴 | | | |
| | | エンコラフェニブ | 300 | mg/body | 分1 | 連日 | 経口 | | | |
| 1929 | Retifanlimab/CBDCA/PTX | バクリタキセル | 80 | mg/m ² | 1時間 | day1,8,15 | 点滴 | 28 | 中等度 | 肛門がん |
| | | カルボプラチン | 5 | AUC | 1時間 | day1 | 点滴 | | | |
| | | レチファンリマブ | 500 | mg/body | 30分 | day1 | 点滴 | | | |